

Wischprobenmonitoring

Abschlußveranstaltung MEWIP

- Kaiserdamm 24
14057 Berlin
- Tel.: 030/3011970
Fax.: 030/30119725
- Email: a.fuhrmann@
witzleben-apotheke.de



Antje Fuhrmann, April 2008

Witzleben Apotheke

- **Schwerpunkte:
Onkologie und HIV – Beratung**
- **zertifiziert** seit November 2003 nach **DIN EN ISO 9001 (2000 -12)**
- seit Juli 2004 Filialapotheke der Apotheke 26, Kaiserdamm 26, 14057 Berlin
- 2. Filiale seit März 2007: Columbia Apotheke, Kaiserdamm 13, 14057 Berlin

Büro- und Vorbereitungsbereich



Lagerung der Zytostatika



Vor dem Betreten des Zytolabors

- Ausziehen der Straßenschuhe / des Apothekenkittels
- Ablegen von Uhren und Schmuck
- Zusammenbinden langer Haare
- Anziehen des Mundschutzes / der Haarhaube
- Anziehen des Laborkittels
- Anziehen der Laborschuhe im hinteren Bereich der Schleuse

Schleuse und Zytolabor



Herstellung einer Infusion



Hygieneplan

Was wird gemacht?	Wann ist es zu tun?	Wo wird es gemacht?	Womit wird es gemacht?	Wie wird es gemacht?	Wer macht es?
Händereinigung	bei Bedarf, nach jeder Zytostatikaherstellung, bzw. bei jedem Handschuhwechsel während der Zytostatikaherstellung	Waschbecken in der Schleuse	Baktolin® sensitive	Waschlotion auf die feuchten Hände auftragen, aufschäumen und mit lauwarmen Wasser gründlich abspülen. Mit Einmalhandtüchern trocknen.	Pharm. Personal, Reinigungspersonal
Händedesinfektion	vor jedem Betreten des Zytostatikalabors und des „Nahrungsraumes“, zusätzlich vor jedem Anziehen steriler Handschuhe für die Herstellung	Waschbecken in der Schleuse	Sterillium®, Desderman® N	Ca 3 ml des Desinfektionsmittels mit dem Spenderhebel per Ellenbogen entnehmen, Hände vollständig einreiben und mind. 30 Sekunden einwirken lassen.	Pharm. Personal
Reinigung aller Arbeitsflächen, inkl. der Leisten, des Telefons, des Weckers, aller Stifte und Türgriffe	vor und nach jeder Herstellung, bei der täglichen Reinigung	im Zytostatikalabor und im „Nahrungsraum“	Bacillol® AF	Die zu desinfizierenden Flächen mit einem getränkten Tuch vollständig feucht abwischen, mind. 30 Sekunden einwirken lassen.	Pharm. Personal, Reinigungspersonal
Reinigung der Arbeitsfläche, sowie der Nierenschalen und des Stiftes in der Laminar Air Flow Box	vor und nach jeder Herstellung	in der Laminar Air Flow Box im Zytostatikalabor und im „Nahrungsraum“	Bacillol® AF	Die zu desinfizierenden Flächen werden mit einem getränkten Tuch vollständig feucht abgewischt. Einwirkzeit mind. 30 Sekunden.	Pharm. Personal

Hygieneplan

Was wird gemacht?	Wann ist es zu tun?	Wo wird es gemacht?	Womit wird es gemacht?	Wie wird es gemacht?	Wer macht es?
Reinigung der Fußböden, inklusive der Leisten; Reinigung des Waschbeckens in der Schleuse	täglich	im Zytostatikalarbor, in der Schleuse	Mikrobac® forte	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel (0,5%ige Lösung) angefeuchteten, sauberen Einmaltuch abzuwischen.	Reinigungs-personal
Reinigung der OP-Schuhe	täglich	in der Schleuse	Mikrobac® forte	Die Schuhe sind mit einem mit Desinfektionsmittel (0,5%ige Lösung) angefeuchteten, sauberen Einmaltuch abzuwischen.	Reinigungs-personal
	14-tägig	im Waschsalon	ohne Waschmittel	Waschen der Schuhe bei 60°C.	
Reinigung des Mülleimers	täglich und nach Bedarf bei Bedarf	im Zytostatikalarbor im „Nahrungsraum“	Mikrobac® forte	Volle Tüte entsorgen, Mülleimer mit einem mit Desinfektionsmittel (0,5%ige Lösung) angefeuchteten, sauberen Einmaltuch abwischen und anschließend neue Mülltüte einlegen.	Reinigungs-personal
Reinigung der Stuhlräder	täglich	im Zytostatikalarbor	Mikrobac® forte	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel (0,5%ige Lösung) angefeuchteten, sauberen Einmaltuch abzuwischen.	Reinigungs-personal

Hygieneplan

Was wird gemacht?	Wann ist es zu tun?	Wo wird es gemacht?	Womit wird es gemacht?	Wie wird es gemacht?	Wer macht es?
Reinigung der Transportboxen	täglich	in der Schleuse	Bacillo® AF	Sobald eine Transportbox nach einer Auslieferung zurückgebracht wird, wird der Boden mit Desinfektionsmittel gereinigt und die Boxen in dem hinteren Bereich der Schleuse gestapelt.	Pharm. Personal, Reinigungspersonal
Reinigung der Transportboxen und der Kiste der gekühlten Anbrüche	einmal wöchentlich			Einmal wöchentlich werden die Transportboxen von Frau Litteritz innen und außen, die Anbruchkiste vom pharmazeutischen Personal gereinigt.	
Intensivreinigung der Laminar Air Flow Box	einmal wöchentlich, nach der letzten Herstellung der Woche, sowie nach jeder Leckage	Laminar Air Flow Box im Zytostatikalarbor und im „Nahrungsraum“	Bacillo® AF	Alle Flächen, inklusive der Scheibe, der Lampen und dem Bereich unter der Arbeitsfläche werden mit einem getränkten Tuch vollständig feucht abgewischt. Einwirkzeit mind. 30 Sekunden.	Pharm. Personal
Inventarreinigung: alle Schränke innen und außen, die Uhr, die Laminar Air Flow Box außen, alle Fenster, sowie den Drehstuhl	einmal monatlich	im Zytostatikalarbor, im „Nahrungsraum“ und in der Schleuse	Bacillo® AF	Die zu desinfizierenden Flächen werden mit einem getränkten Tuch vollständig feucht abgewischt. Einwirkzeit mind. 30 Sekunden.	Reinigungspersonal

Desinfektionsmittel

- **Mikrobac® forte (Fa. Bode) 5 Liter**

aldehydfreier Flächendesinfektionsreiniger zur täglichen Desinfektion der Böden



- **Bacillol® AF (Fa. Bode) 1000 ml**

aldehydfreies, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel für die tägliche Desinfektion der Arbeitsflächen



- **Sterillium® (Fa. Bode) 1000 ml**

für die hygienische Händedesinfektion

MEWIP-Studie in unserer Apotheke

- **Witzleben Apotheke:** Mitglied der **Kontrollgruppe** (B-Gruppe)
- Durchgeführte Wischproben: 09.03.2006 + 12.06.2007
- Wischprobenorte: - Boden vor der Werkbank
 - Arbeitsfläche des Anreichers
 - Kühlschranktür incl. Griff
- **Bei keiner Probe konnten Verunreinigungen nachgewiesen werden!**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

An der Durchführung der
MEWIP-Studie waren bei
uns beteiligt:

Claudia Neuhaus
Stefanie Köppel
Alexandra Schwartz
Antje Fuhrmann



Antje Fuhrmann, April 2008